

**Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:****Şarj numarası:**

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 21.06.2010 - 2010/173

**KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR:**

Zararlı Türü-Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama oranı ve dozu
Karınca – Ergin	Kapalı Alan İstasyon Uygulaması	2 g/10m <sup>2</sup>
	Kapalı Alan Jel Uygulaması	2 damla/m <sup>2</sup> (0,2 g/m <sup>2</sup> )

\*Bir damla yaklaşık 0,1 g' dir ve 0,5 cm çapındadır.

**Maxforce Quantum**, karınca kontrolünde kullanılan çekici ve hızlı etkili kullanıma hazır, kokusuz ve berrak görünümlü bir yemdir. Formulasındaki koloidal maddeler yemin, karıncalar için uzun süre çekici kalmasını sağlar. Uygulanan yem damlacığı, karınca kolonisinin gıda ihtiyacını sağlayan işçi karıncalar tarafından yuvaya taşınmakta ve böylelikle yuvadaki diğer karıncalar tarafından da tüketilerek koloninin kontrol altına alınması sağlanmaktadır.

**Uygulamadan Önce:** Ortalıkta açık gıda maddesi varsa kaldırılmalı ve gıda kırıntıları ortamdan titizlikle uzaklaştırılmalıdır. Uygulama yapılacak alan olarak, karıncaların gezindiği ve beslendiği alanlar seçilmelidir. Uygulama alanı seçilirken bırakılan damlacığa, çocukların ve evcil hayvanların kolaylıkla ulaşamayacağı yerler tercih edilmelidir.

**Uygulama Anında:** Uygulamadan önce karışım, çalkalama vb. gibi hazırlık gerektirmeyen, pratik uygulanan, tüp içerisinde jel formülasyondadır. Spreylenmesi uygun olmayan ya da zor olan gıda üretim tesisleri, mutfak, restoran, hastane, otel, kreş vb. alanlarda kullanıma uygundur. Uygulama, istasyon içerisine veya emici olmayan yatay yüzeylere damla bırakmak suretiyle yapılır. Sıcak, tozlu, nemli ve kirlili yüzeylere uygulamayınız. Başka bir insektisit ile karıştırılması ya da başka bir insektisitini uyguladığı yerlerde, aynı zamanda uygulanması önerilmez. Ürünün etkisini göstermesi için uygulanan damlacıklar yüzeylerde kalmaya devam etmelidir. Karınca problemi sonlanıncaya kadar ortamdaki damlacıkları temizlemeyiniz. Uygulama alanı olarak, muhtemel tüm kolonilere yemi ulaştırmak için, karıncaların görüldüğü birden fazla alanın seçilmesi tavsiye edilir. Kapalı alanlarda karıncaların görüldüğü ve saklandığı alanlara en yakın noktalara, çatlak, yarık, delik, köşe ve diğer saklanma alanlarına uygulanır.

**Uygulamadan Sonra:** Uygulamadan 2-3 gün sonra karınca aktivitesi kontrol edilmeli ve ihtiyaç duyulması halinde (yem damlacıkları tamamen tüketilmiş ise veya tüketilmeyecek şekilde kirlenmiş ise) yeniden uygulama yapılmalıdır. İstenmeyen alana bulaşan yem, sünger ve % 5lik sodyum klorid ile temizlenir.

**Üretici firmanın adı ve adresi;**Bayer Environmental Science SAS,  
16, rue Jean- Marie Leclair  
69009 Lyon CEDEX 09 FRANSA**Ruhsat sahibinin adı ve adresi;**Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.  
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:53  
34770 Ümraniye İSTANBUL**Üretim yeri adı ve adresi:**

Bayer S.A.S. Division Crop Science

Site de Marle - Rue Cyrille Liebert Crossing Rue  
Antoine Laurent de Lavoisier Zone Industrielle BP2  
02250 Marle-sur-Serre / FRANSA**Net Miktarı:** 2 g istasyon - 2 g- 4 g- 5 g- 8 g - 10 g- 15 g - 20 g - 30g eAmbalajı açılmış ürünü 1 yıl içinde kullanınız.  
Ürünün normal koşullarda raf ömrü 2 yıldır.**KULLANICI GRUBU**

GENEL HALK

**KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ  
MUTLAKA OKUYUNUZ****Maxforce Quantum®****Karınca Mücadelesi İçin İnektisit****Formülasyon şekli**Jel (Kullanıma hazır jel yem)  
İstasyon (kullanıma hazır istasyon)**Aktif maddenin adı ve miktarı (% a/a)**

Imidacloprid, (saf) % 0.03 CAS No: 138261-41-3

**Yardımcı maddenin adı ve miktarı (%)**Bitrex % 0.01, cezbedici madde ve çözücü ile % 99.959 %100'e  
tamamlanır.**ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN  
UZAK TUTUNUZ.****BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.  
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HiÇBİR ŞEY  
YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.  
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ  
ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.****Boş ambalaj imha şekli:**Boş ambalajları dere, göl, ırmak gibi doğal su kaynaklarının  
bulunduğu yerlere atmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.**ÜRÜN TİPİ (18)  
İNSEKTİSİT****Zehirlenme belirtileri:** Hissizlik durumu, kasılma, nefes almada güçlük,  
titreme ve kramp.Imidacloprid: (Akut Oral) (sıçan) LD<sub>50</sub> = 450 mg/kg  
Maxforce Quantum: (Akut Oral)(sıçan) LD<sub>50</sub> > 2.500 mg/kg**İlk yardım önlemleri:****Deri teması:** Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Semptomlar  
devam ederse doktora başvurunuz.**Göz teması:** Gözle teması halinde, kontakt lensleri çıkarınız, göz kapakları  
dahil gözü bol suyla en az 15 dk. yıkayınız. Tahris oluşur ve devam ederse  
doktora gidiniz.**Yutulması halinde:** Hastayı ürün etiketiyle birlikte doktora götürünüz.**Antidotu ve gerekli bilgiler:**

Antidotu bilinmemektedir, semptomatik tedavi uygulanır.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA  
MERKEZİ (UZEM)\*NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.****ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT  
EDİLECEK HUSUSLAR**Artık ilaçları göllere, durgun ve akarsulara, havuzlara bulaştırmayınız.  
**Arılar için zehirlidir.****TEHLİKE AÇIKLAMALARI****H411** Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için zehirlidir.**EUH401** İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerinden kaçınmak için,  
kullanım talimatlarına uyunuz**ÖNLEM AÇIKLAMALARI****P102** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.**P273** Çevreye yayılmasını önleyiniz.**P391** Döküntüleri toplayınız.**P501** İçerikleri/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız.

Bakanlık Onayı



14 Ocak 2019