

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 11.01.2011 – 2011 / 304

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı	Uygulama şekli	İstasyon içerisinde uygulama dozu	Uygulama aralığı
Fare – Ergin	Mesken ve mesken çevresi	İstasyonlar içerisinde düşük popülasyonlarda 5 m’de bir, yoğun popülasyonlarda 3 m’de bir uygulayınız.	İstasyon başına 20-30 gram	2-3 günde bir kontrol edilerek, zararlı varlığına göre uygulama tekrarına karar verilir
Sıçan – Ergin	Mesken ve mesken çevresi	İstasyonlar içerisinde düşük popülasyonlarda 10 m’de bir, yoğun popülasyonlarda 5 m’de bir uygulayınız	İstasyon başına 100 gram	2-3 günde bir kontrol edilerek, zararlı varlığına göre uygulama tekrarına karar verilir

1 pasta yem= 10 gram

Kullanma şekli:

- Ambalajın açılmasından başlayarak mücadelenin tüm aşamalarında mutlaka ELDİVEN kullanınız. Bu hem sizi koruyacak hem de fare ve sıçanların insan kokusundan etkilenecek yem tüketiminden kaçınmasını engelleyecektir.
- Yem istasyonlarının uygulanması sırasında hedef dışı canlıların temasını engelleyecek ve fare ve sıçanların tüketiminin daha kolay olmasını sağlayacak alanları seçiniz.
- UYGULAMA MUTLAKA YEM İSTASYONU İÇERİSİNDE YAPILMALIDIR. Yem istasyonları çocuklar ve hedef dışı canlılar tarafından açılmaya karşı korumalı ve içerisinde yemin dış etmenlerden koruyacak dayanıklılıkta olmalıdır.
- Yem istasyonlarının yerleştirileceği en iyi alanlar, kemirilmiş alanlar, kemirgen dışıklarının görüldüğü yerler, asma tavanlar ve insan aktivitesinin az olduğu karanlık ve kuytu bölgelerdir.
- Zararlı tespit edilen uygun alanlara YEM İSTASYONLARI yerleştirilmeli ve içerisine uygulama tablosuna uygun miktarda ürün bırakılmalıdır.
- 2-3 gün aralıklarla yem istasyonlarını/uygulama yapılan yerleri kontrol ederek tüketilen yemlerin yerine yenilerini ekleyiniz.
- Tüketilmeyen yemlerin bulunduğu istasyonların yerlerini ve buluşuk ve bozulmuş yemleri yenisi ile değiştirin.
- Fare ve sıçanların izleri kayboluncaya kadar uygulamaya devam ediniz.

Üretici firmasının adı ve adresi;

LiphaTech S.A.S. Production centre, Av Jean Serres, ZA Malère,
47480 Pont du Cassé, FRANSA
Ruhsat sahibinin adı ve adresi;
Bayer Türk Kimya San.Ltd.Şti.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan cad. No: 53
34770 Ümraniye / İSTANBUL

Net Ağırlığı: 100 g (10 x 10g) – 150 g (15 x 10 g) - 200 g (20 x 10 g) – 250 g (25 x 10 g) - 300 g (30 x 10 g) – 330 g (33 x 10 g) - 350 g (35 x 10 g) - 400 g (40 x 10 g) - 500 g (50 x 10 g) - 750 g (75 x 10 g) - 1000 g (100 x 10 g) – 1200 g (120 x 10 g) – 1250 g (125 x 10 g) – 1500 g (150 x 10 g) – 1750 g (175 x 10 g) – 2000 g (200 x 10 g) – 3000 g (300 x 10 g) - 5000 g (500 x 10 g) – 7500 g (750 x 10 g) – 10000 g (1000 x 10 g) e

Ambalajı açılmış ürünü 1 ay içerisinde kullanınız.
Ürünün raf ömrü 25±2 °C’de 2 yıldır.

KULLANICI GRUBU (UZMAN PERSONEL)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ



Rodilon® Paste

Fare ve Sıçanlara Karşı Antikoagülan özelliikli Rodentisit

Formülasyon şekli Pasta

Aktif maddenin adı ve miktarı (% a/a)
Difethialone, (saf) % 0.0025 CAS No: 104653-34-1

Yardımcı maddeler ve miktarları

%99.9965 diğer yardımcı maddeler ve %0,001 Bitrex ile % 100’e tamamlanır.

- Fare ve sıçanlara karşı etkili
- İçerisindeki Bitrex insanların ve hedef dışı canlıların yemi kaza ile yemesini önler.

COCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HIÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

BOŞALAN AMBALAJ İMHA ŞEKLİ:

Boşalan ambalajı usulüne uygun şekilde imha ediniz.

ÜRÜN TİPİ 14 RODENTİSİT

Zehirlenme belirtileri:

RODİLON PASTE ‘nin muhafaza ve kullanılmasında dikkatsizlik ve ihmal sonucu ağızdan alındığı takdirde hemen doktora başvurunuz.

LD₅₀ değeri:

Difethialone: akut oral LD50 (sıçan) : 0.56 mg/kg
Rodilon Paste: akut oral LL50 (sıçan) > 2.000 mg/kg

İlk yardım önlemleri

Genel öneri: Tehlikeli bölgenin dışına çıkartınız. Etkilenen kişiyi stabil yan konumda yatırıp taşıyınız. Kirlenmiş giysilerinizi hemen çıkarın ve güvenli bir şekilde bertaraf edin.

Deri teması: Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.

Göz teması: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Tahriş oluşur ve devam ederse doktora gidiniz.

Ağız yoluyla alma: Ağız çalkalayınız. Kusturmayınız. Doktora başvurunuz.
Doktor için uyarılar semptomlar: Çürük ve kanama oluşumu, Kan ihtiva eden idrar, Kanlı dışkı, Kan ihtiva eden kusmuk, Burun kanaması, Dişeti kanaması

Antidotu ve gerekli bilgiler

Ağır vakalarda kanın pıhtılaşma zamanı kontrol edilerek gereğince VİTAMİN K1 (KONAKLON) tatbik edilmelidir.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA
MERKEZİ (UZEM)’NİN 114 NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Kapları ağızları sıkıca kapalı olarak kuru, soğuk ve iyi havalandırılmış yerlerde 25±2 °C’de saklayınız. Orijinal kabı içinde saklayınız. Yetkili personel tarafından girilip çıkılan odalarda saklayınız. Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Anılar için zehirlidir.

Balıkla ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir

TEHLİKE AÇIKLAMALARI

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

ÖNLEM AÇIKLAMALARI

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P260 Tozunu/ dumanını/ gazını/ sisini/ buharını/ spreyini solumayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız.

P501 İçerikleri/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız.



BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 53 Ümraniye / İstanbul
Tel: (0216) 526 36 00
Faks: (0216) 526 38 68