



00017693762



Sayı : 19020089/105.02.03

Konu : Klerat Pellet

SYGENTA TARIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş  
Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. Bayraklı Tower No:81 Kat: 17

Bayraklı/ İZMİR

İlgi : Genel Evrak Birimine kayıtlı 04.01.2016 tarihli ve 125 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda, Başkanlığımızdan firmanız adına 27.05.2005 tarihli ve 2011/496 sayılı ruhsatı bulunan "Klerat Pellet" isimli ürünün ruhsat geçerlilik süresinin 31.12.2015 tarihinde dolacağı bu suretle ruhsatın süresinin uzatılması talep edilmektedir.

Talebiniz uygun bulunmuş olup Makam Olurları doğrultusunda geçerlilik süresi 31.12.2021 tarihi olan Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi ve onaylı etiket örneği yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Dr. Hüseyin İLTER  
Bakan a.  
Daire Başkanı

Ekler:

- 1 Adet Ruhsat
- 1 Adet Onaylı Etiket

Sağlık Mahallesi Adnan Saygın Cad. No: 55 Çankaya/ANKARA  
Sağlık Uzm. Yard. F. COŞKUN

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 0372b9fc-b585-43b6-b31f-c1201933e277 kodu ile erişebilirsiniz.  
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

20 Ocak 2016  
Belgenin Aslı  
Elektronik İmzalıdır



**Üretim Tarihi:**  
**Son Kullanma Tarihi:**  
**Sarı numarası:**  
**Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:** 2011/496 - 27.05.2005

Şarj numarası, üretim ve son kullanma tarihleri ambalajın üzerindedir.

### Zararlı Türü ve Uygulama Alanına Göre Uygulama Dozları ve Aralıkları

| Zararlı Türü | Uygulama Alanı ve Şekli                  | Uygulama Dozu                   | Uygulama Aralığı  |
|--------------|--|---------------------------------|---|
| Fare         | 3-5 metre aralıklarla istasyon yenileme  | İstasyon başına 15-30 g pellet  | Periyodik aralıklarla istasyonlar kontrol edilir, aktivite devam ediyorsa uygulama tekrarlanır. |
| Sıçan        | 5-10 metre aralıklarla istasyon yenileme | İstasyon başına 50-100 g pellet |   |

**Klerat Pellet** fare ve sıçan mücadelesinde kullanılmak üzere geliştirilmiş pellet formunda bir rodentisittir. İçeriğindeki **Birex®** maddesi yemin hedef dışı canlılar tarafından tüketilmesini engeller.

### KULLANIM ŞEKLİ

Ürün kullanılırken mutlaka eldiven giyilmelidir. Duvar kenarları, asma tavanelar, köşeler, kemirilmiş alanlar ve fare veya sıçan dışkularının yoğun olarak görüldüğü yerlerde, tablodaki belirtilen miktarlarda pellet kullanılmalıdır. Yem çekimliliği yaramadığından ön yenilemeye gerek yoktur. Uygulanma yapılacak alanda alternatif gıda kaynakları ortamdaki uzaklaştırılmalıdır. Ürün antikoagülant (pıhtılaşmayı önleyici) özelliğe sahip olduğundan birden fazla bir parça yiyen fare veya sıçanlar içi kanama geçirirler. Yem istasyonları periyodik olarak kontrol edilmeli, popülasyon aktivitesi sona erene kadar yemin tüketildiği istasyonlara kemirgen türüne göre tablodaki önerilen miktarlarda yem konulmalıdır.

**Üretici firmamızın adı ve adresi**  
Syngenta Hellas S.A.  
Anthouss Avenue, GR-153 49  
Athoussa, Attica / YUNANİSTAN

**Ruhsat sahibinin adı ve adresi:**  
Syngenta Tarım San. ve Tic. A.Ş.  
Mansuroğlu Mah. Ankara Cad.  
Bayraklı Tower No. 81, Kat 17  
35030 Bayraklı - İzmir / TÜRKİYE

Ürünün normal şartlarda raf ömrü 2 yıldır.  
Ambalajı açılmış ürünü 1 ay içerisinde kullanınız.

**Ağırlık:** 80g – 100g – 250g – 500g – 5kg – 10kg – 40kg – 100 kg

**SYNGENTA TARIMI**  
**SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

ÜRÜN TİPİ: 14 RODENTİSİT  
KULLANICI GRUBU: UZMAN PERSONEL

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ VE PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ

# syngenta

## Klerat® Pellet

### Fare Zehiri

FORMÜLASYON ŞEKLİ: Pellet

**Brodifacoum:** % 0,005 (a/a) CAS: 56073-10-0  
**Birex® (Denaonium Benzoate):** % 0,001 (a/a) CAS: 3734-33-6  
**Solvent ve yardımcı maddeler:** % 5,044 (a/a)  
**Bıyık:** % 94,950 (a/a)

■ ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ. ■ BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ. ■ UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ. ■ UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ. ■ İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMENİZ İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

### BOSALAN AMBALAJ İMHA ŞEKLİ:

Boşalan ambalajı usulüne uygun şekilde imha ediniz.

Arlar için zehirlidir.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Belirtiler, antikoagülanlarla zehirlenmenin tipik semptomlarıdır. Şiddetli durumlarda eklem yerlerinde çürümeye ve hematom, dışkı ve idrarda kan görülür.

### LD<sub>50</sub> DEĞERLERİ

LD<sub>50</sub> Klerat Pellet (Ürün) (Sıçan Akut Oral): >5000 mg/kg

### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

**Genel Tavsiyeler :** Syngenta acil durum numarasını, zehir danışma merkezini ya da doktoru ararken ya da tıbbi müdahale alacağınız zaman tıbbi ambalajını, etiketini ya da ürün Güvenlik Bilgi Formu nu yanınızda bulundurun. **Soluma durumunda :** Hastayı açık havaya çıkarın. Solunum düzenlenirse ya da dumansız sınıt solunum yapın. Hastayı rahat ve sıcak bir yerde tutun. Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine ulaşın. **Deri teması:** Derhal ilacı bulduğunuz doktora başvurun. İlaç bulduğunuz giysileri çıkarın. Deri tahriş olmuşsa doktora başvurun. İlaç bulduğunuz giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın. **Göze temas durumunda:** Derhal gözleri bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lenslerinizi çıkarın. Derhal tıbbi yardım gerektirir. **Yutulması durumunda:** Hastayı hemen hastanaya götürün. Hastayı kusmaya ZORLAMAYIN.

### ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEMD)NİN HİTANOLU TELEFONUNU ARAYINIZ

### ANTİDÖTÜ VE GEREKLİ BİLGİLER

Bu ürün protrombin sentezine müdahale eden maddeler gibi benzer özellikler gösteren antikoagülant maddeler içerir. Etkinin spesifik ölçümünü protrombin zamanını ölçmek için 12-18 saatte kadar uzamama ihtimalini unutmayınız. Spesifik antidotu K vitamindir (Fitomenadion). Antidot tıbbi gözetim altında kullanılmalıdır. Başlangıçta antidot enjeksiyon yoluyla verilmelidir: çocuklar için 10-20 mg veya 0,25 mg/kg, yavaş intravenöz infüzyon hızı 1 mg/dk. 1 yıl geçmemelidir. İyileştirme tedavisi ağız yoluyla (yetişkinler için 40 mg/gün bölünmüş dozlar, çocuklar için 20 mg/gün bölünmüş dozlar) verilir. Protrombin zamanı ve hemogloblin izlenmelidir. Hastalar protrombin zamanı sonrası 3 gün boyunca normale dönene kadar tıbbi gözetim altında tutulmalıdır. Ağız yoluyla tedavi birkaç ay (yetişkinler için 20 mg/gün bölünmüş dozlar, çocuklar için 20 mg/gün, hayvanlar için doz 2-5 mg/kg bölünmüş dozlar) sürebilir.

### ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN

#### DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

**Ellekleme:** Yangına karşı özel koruyucu tedbirler gerekli değildir. Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Kullanım sırasında yemeyin, içmeyin, sigara kullanmayın. Kişisel korunma için tıbbi Güvenlik Bilgi Formu Bölüm 8'e bakınız. **Depolama :** Özel depolama koşulları gerektirir. Ambalajları ağzı sıkıca kapatılmış şekilde, kuru, serin ve iyi havalandırılmış yerde saklayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Gıda, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

### TEHLİKE İBARELERİ VE ACIKLAMALARI

H302 Yutulması halinde zararlıdır.  
H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.  
H332 Solunması halinde zararlıdır.

### GÜVENLİK İBARELERİ VE ACIKLAMALARI

P261 Tozunu/dumanı/gazını/buharı/spreyini solunmaktan kaçının.  
P264 Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın.  
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.  
P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.  
P280 Koruyucu eldiven/kyateler giyin.  
P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, **Zehir Merkezini** veya doktoru/hekimini arayın.  
P322 Özel önlemler (etikete bakın)  
P330 Ağızınızı çalkalayın.  
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.  
P301+P312 Yutulduğunda: **Zehir Merkezini** veya doktoru/hekimini arayın.  
P302+P352 Deri ile temas halinde ise: Bol sabun su ile yıkayın.  
P304+P340 Solunduğunda: Neless alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurban temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.  
P501 İçerdiği/kabı yerel yönetmelige uygun olarak bertaraf edin.

13-01-2016

GHS07  
DİKKAT

